

## Plaagwijzer

voor plaaginsecten in huis



Plaaginsect herkennen



Schadebeeld



Natuurlijke vijanden



Tip voor optimale bestrijding

### Voedsel- & kledingmot



Kleine bruine vlindertjes die 's avonds door je huis vliegen. In je voorraadmast of kledingkast vind je larven van 1-3 cm terug.



Larven van voedselmotten vreten voedsel en verpakkingen aan. Larven van kledingmotten vreten gaatjes in je kleding.



Minuscule kleine **Trichogramma sluipwespen** parasiteren de motteneitjes. Zo doorbreek je de voortplantingscyclus.



Combineer de sluipwespen met een kleefval voor **voedselmotten** of **kledingmotten** om de plaag te monitoren.

### Rouwvliegjes



Kleine zwarte vliegjes met lange poten. Fladderen rond je planten en leggen eitjes in potgrond.



De larven vreten aan plantwortels. De plant groeit slecht en verzwakt. Volwassen vliegjes kunnen schimmels en ziekten overbrengen.



**Steinernema feltiae aaltjes** of **Hypoaspis miles roofmijten** tegen de eitjes, larven en poppen in de grond.



Vang volwassen vliegjes af met **gele vangplaatjes**.

### Witte vlieg



Kleine witte vliegjes die onderaan bladeren zitten. Raak je de plant aan, dan vliegt er een wolk met vliegjes op.



Zuigt plantsappen uit jonge bladeren. De plant verzwakt, raakt vervuild door de waslag die het vliegje produceert en er ontstaat roetdauwschimmel.



**Encarsia formosa sluipwespen** parasiteren eitjes, **Macrolopus pygmaeus roofwantsen** richten zich ook op volwassen vliegjes.



Vang extra volwassen vliegjes af met **gele vangplaten**.

### Spint



Spintmijten zijn niet groter dan 0,5 mm. Besmetting herken je vooral aan fijne webben die de mijten rond een plant spannen.



Halen aan de onderkant van het blad voeding uit je plant. Er ontstaan witte of gele plekkjes die door schimmelvorming langzaam bruin kleuren.



Preventief gebruik je **Amblyseius californicus roofmijten**, bij een plaag gebruik je **Phytoseiulus persimilis roofmijten**.



De ene roofmijt richt zich op jonge stadia van spint, de andere op volwassen spintmijten. Een **mix van beide roofmijten** is extra effectief.

### Trips



Kleine vliegjes van niet meer dan 1 mm op en rond je planten. De voortplanting gaat snel waardoor je er in korte tijd enorm veel last van krijgt.



Zuigen plantcellen leeg. Er ontstaan grijze en bruine plekken op het blad dat uiteindelijk volledig zal afsterven.



**Hypoaspis miles roofmijten** tegen larven en poppen. **Orius laevigatus roofwantsen** en **Amblyseius cucumeris roofmijten** tegen volwassen trips.



Zet besmette planten in quarantaine. Zo kan je voorkomen dat de trips naar andere planten vliegen.

### Wolluis



Witte luis die een wol-achtige witte afscheiding achterlaat op planten.



Voedt zich met plantsap en produceert witte afscheiding en honingdauw. Planten verliezen hun groei-kracht en sterven.



**Cryptolaemus larven** bij de eerste tekenen van besmetting. **Cryptolaemus lieveheersbeestjes** bij een plaag.



Liever een huis-tuin-&-Keuken oplossing? Stip de wolluizen dagelijks aan met een wattenstaafje met spirituswater.

### Bladluis



Groene, witte, zwarte, gele of rode luizen, niet groter dan 5 mm. Je vindt ze onderaan het blad, met name op jonge stengels en bladeren.



Prikken gaatjes in het blad en de stengels en zuigen er sap uit. De plant verzwakt en er ontstaat roetdauwschimmel.



Bij een plaag gebruik je **Adalia lieveheersbeestjes** of **Chrysoperla gaasvliegen**. Een **sluipwespenmix** werkt als preventieve bestrijder.



Beginnende plaag? De plant goed afspoelen is vaak al voldoende.

### Schild- & dopluis



Bruine, gele of grijze luizen van 3-4 mm groot. Hebben een schild en zitten vaak op of onder een blad, met name rondom de nerven.



Voeden zich met plantsappen. Er komen daardoor bruine plekken op de bladeren. De plant verzwakt en er kan roetdauwschimmel ontstaan.



**Rhyzobius lophanthae lieveheersbeestjes** tegen schildluis, **Coccophagus scutellaris sluipwespen** tegen dopluis.



Zet je planten niet op de tocht of in heel droge lucht. Hierdoor trekken ze luizen aan.