

Plaagwijzer

voor plaaginsecten in de tuin



Plaaginsect
herkennen



Schadebeeld



Natuurlijke
vijanden



Tip voor optimale
bestrijding

Engerlingen



Vraatzuchtige larven van diverse kevers (o.a. meikever, junikever & rozenkever). Zijn wit, met een bruine kop, grijs achterlijf en 6 voorpotjes.



Zitten in de grond en vreten aan wortels van gras en planten. Op het gazon zie je gele plekken en losliggend gras.



Bij een bodemtemperatuur vanaf 8° C gebruik je **Steinernema feltiae aaltjes**. Vanaf 12° C zijn **Heterorhabditis bacteriophora aaltjes** effectiever.



Engerlingen zitten meerdere jaren in de grond. Bestrijden met aaltjes moet daarom vaker dan 1 keer. **Meer info vind je op onze website.**

Emelten



Larven van langpootmuggen. Hebben een bruin lijf en geen pootjes. Maken drie larvale stadia door. Volgroeide emelten zijn ongeveer 4 cm.



Vreten aan stukken plant net boven de grond. Ze trekken stengels onder de grond. Op het gazon zie je gele plekken en afstervend gras.



Bestrijden kan met **Steinernema carpocapsae aaltjes**. Deze zijn te gebruiken bij een bodemtemperatuur vanaf 12° C.



Wil je bestrijden op een groot oppervlakte? Met de **AquaNemix sproeier voor aaltjes** gaat dit snel en eenvoudig.

Bladluis



Groene, witte, zwarte, gele of rode luizen, niet groter dan 5 mm. Je vindt ze onderaan het blad, met name op jonge stengels en bladeren.



Prikken gaatjes in het blad en de stengels en zuigen er sap uit. De plant verzwakt en er ontstaat roetdauwschimmel.



Bij een plaag gebruik je **Adalia lieveheersbeestjes** of **Chrysoperla gaasvliegen**. Een **sluipwespenmix** werkt als preventieve bestrijder.



Last van bladluis? Dan heb je vaak ook last van mieren. Mieren beschermen bladluizen en doden lieveheersbeestjes. Bestrijd daarom de mieren eerst.

Buxusrups & -mot



Buxusmotten hebben witte vleugels met een bruine rand. Volgroeide buxusrupsen zijn felgroen met zwarte stippen en strepen op hun lijf.



De jonge rupsen vreten enorm veel bladmoes van met name buxushagen. Bij een plaag blijft er uiteindelijk niets meer van de struik over.



Gebruik tegen de rupsen een mix van **Steinernema feltiae** en **carpocapsae aaltjes**. De motten vang je af met een **feromoonval**.



Aaltjes worden meestal toegepast in de bodem, maar deze mix moet juist direct op de rupsen worden gespoten. **Gebruik hiervoor een sproeier.**

Slakken



Slakken zijn bijna het hele jaar actief. De naaktslak bevindt zich grotendeels in de bodem, maar bij vochtig weer zie je ze ook veel bovengronds.



Vreten aan allerlei gewassen, vooral in de moestuin zijn ze vervelend. Je herkent slakkenvraat aan gaatjes in het blad en slijmsporen.



Naaktslakken bestrijd je ondergronds met **Phasmarhabditis californica aaltjes**. Bovengronds gebruik je **biologische slakkenkorrels**.



Zorg voor extra bescherming door een **slakkenwal** of **kopertape** te gebruiken. Je creëert daarmee een barrière voor de slakken.

Mieren



Mieren vind je op veel plekken: het gazon, terras, in borders, bomen en soms zelfs in huis.



Bouwen nesten met gangenstelsels onder de grond. Bestrating kan hierdoor verzakken en het zorgt voor kale plekken in het gras.



Steinernema feltiae aaltjes parasiteren de larven en verjagen volwassen mieren. Daarnaast is een **mierenlokdoos** effectief.



Zie je veel mierenhopen? Spuut een extra geconcentreerd aaltjesmengsel direct in het nest.

Eikenprocessierups



Harige rupsen die zich bevinden in eikenprocessiebomen. De rupsen zitten dicht bij elkaar in gesponnen nesten rond de stam en takken.



Hebben brandhaartjes die tot vervelende klachten aan de huid en ogen kunnen leiden. Blijf op afstand en raak de rups daarom nooit.



Eind maart/begin april bestrijd je ze met **Steinernema feltiae aaltjes**. De rupsen zijn dan nog klein en hebben nog nauwelijks brandharen.



Eikenprocessievinders kan je afvangen met een **feromoonval**. Verder kan je de rupsen nog bestrijden met een biologisch afbreekbaar **fixeermiddel**.

Bloedluis



Kleine rode mijt die zich voedt met bloed van o.a. kippen, volièrevogels en reptielen. Kan in korte tijd een enorme plaag worden.



Voedt zich met bloed van dieren. Dit zorgt voor stress en gezondheidsproblemen bij de dieren. Overdag zit de bloedluis verstopt in kieren in het hok.



Hypoaspis miles roofmijten zijn effectief als natuurlijke vijand van de bloedluis en kan goed in een dierenverblijf worden uitgezet.



Bloedluis in het kippenhok? Het **bloedluis totaalpakket** bevat alles wat je nodig hebt tegen de plaag. Gebruik de middelen ook preventief.